



cenicana
Centro de Investigación
de la Caña de Azúcar de
Colombia

Alerta fitosanitaria

Salivazo en cultivos de caña de azúcar

Aprenda a reconocer el salivazo que está afectando la caña de azúcar en el Valle del Cauca y los síntomas que indican su presencia.


Evite la diseminación de la plaga.

No lleve suelo de una zona infestada por el salivazo hacia una zona libre del insecto. Limpie siempre el barro de las botas antes de salir del campo.

La saliva en el suelo, alrededor de las cepas de caña, indica la presencia del insecto. Las hembras del salivazo ponen los huevos en el suelo.

Las ninfas y los adultos del salivazo chupan la savia de las hojas. El adulto inyecta una toxina que produce la necrosis del tejido foliar.

El adulto del salivazo encontrado en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca, mide entre 6 mm y 8 mm de longitud aproximadamente.



En la porción basal de los tallos se pueden encontrar ninfas recubiertas de saliva.

Hospederos



Caminadora (*Rottboellia* spp.).



Pastos del género *Brachiaria*.

Campo afectado por el salivazo



Si detecta indicios del insecto o la presencia de éste avise de inmediato al departamento técnico de su ingenio, donde le informarán los procedimientos que debe seguir.